

нее в нижней трети, поперечная поверхность суживается к концу. В правой подлопаточной области округлая рана, диаметром около 1 см, просвета которой выступает силиконовый катетер, фиксированный хирургическим швом. В левом локтевом сгибе, на передней поверхности левого предплечья мелкоочаговые кровоизлияния с точечными буроватыми ссадинами на их фоне. ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ. На веке левого глаза у внутреннего угла красно-фиолетовый кровоизлияние без четких контуров, размерами 2,5х0,5 см. Аналогичного характера кровоизлияние расположено на тыльной поверхности средней фаланги 2-го пальца правой кисти, размерами 1,5х1 см. Соответственно разбительной поверхности правого локтевого сустава ссадина неопределенной формы, размерами 3х2,4 см с плотной выступающей серо-коричневой корочкой. Аналогичного характера ссадины расположены соответственно разбительной поверхности правого коленного сустава, размерами 6х4 см, на 4 см выше уровня стопы. В подколенных митакх тавиных судных очковые тусклые буровато-красные кровоизлияния. Отслоив митак тавиных нет. В полости правого коленного сустава небольшое количество желтоватой прозрачной жидкости. Кровоизлияний в связках сустава нет. Других повреждений при наружном исследовании трупа не обнаружено. Кости конечностей на ощупь целы. ВНУТРЕННЕЕ ИССЛЕДОВАНИЕ. Митак тавиных головы по внутренней поверхности серо-красного цвета, умеренно влажные, с темно-красным кровоизлиянием по типу пропитывания в толще правой височной мышцы с переходом на правую теменную область, размерами около 13х12 см. В правой теменной области кровоизлияние распространяется на полнокровное лобно-височное. Обнаружен перелом костей черепа линейной формы с неровными мелкозубатыми заостренными краями, пролегающий на всю толщину костей черепа. Перелом условно начинается на правой теменной кости в точке, расположенной на 3,5 см правее стреловидного шва и на 4,5 см выше лямбдовидного шва. От места условного начала перелом идет снизу вперед и сверху назад и несколько слева направо. Перелом пересекает чешуйчатый шов, переходит на чешую правой височной кости и доходит к основанию скулового отростка височной кости. Длина перелома на своде черепа 11,5 см. Далее перелом переходит на основание черепа и идет по большому крылу клиновидной кости в направлении справа налево и несколько снизу вперед, заканчиваясь на правой боковой стенке клиновидной пазухи. Длина перелома на основании черепа 7 см. Участков вывихивания наружу костной пластины макроскопически не определяется. Остальные кости свода и основания черепа при внутреннем осмотре целы. В пазухе клиновидной кости темно-красная кровь и рыбные темно-красные свертки. В барабанной полости свободной жидкости нет. Продольный размер черепа 15 см, поперечный 13 см. Толщина костей черепа на уровне роста чешуи лобной кости 0,4-0,6 см, чешуи височных костей 0,3-0,4 см, теменных костей 0,6-0,8 см. Твердая мозговая оболочка серого цвета, глянцевая, блестящая. Оболочка рыбно сращена с костями черепа, не напряжена. В синусах твердой мозговой оболочки небольшое количество темной жидкой крови. Между костями черепа и твердой мозговой оболочкой соответственно чешуе правой височной кости и большому крылу клиновидной кости с переходом на наружные отделы правой половины средней черепной ямки определяется кровоизлияние из несколько плотных темных свертков крови на участке размером 7х4х1,5-1 см. Кровоизлияние имеет объем до 15 мл. Под твердой мозговой оболочкой соответственно выпуклой поверхности левой височной, теменной и частично затылочной долей с переходом на левую половину средней черепной ямки определяется тонкопластинчатое кровоизлияние из рыбных темных свертков крови, слабо сраженное с оболочкой, объемом объемом до 20-30 мл. Кровоизлияние задней капсулы не имеет. Под митакми мозговых оболочек соответственно базальной поверхности полюса левой лобной доли определяется кровоизлияние из темно-красных рыбных свертков, размерами 4х3 см. Аналогичного характера кровоизлияния определяются в области полюса и базальной поверхности левой височной доли, размерами 5,5х3 см. В просветившихся кровоизлияниях в коре определяются микрочастицы точечные и шпирообразные темно-синевишно-красные кровоизлияния. Кроме того, вещество головного мозга вокруг данных очагов на участке общими размерами 11х7 см имеет выраженных розовато-синевишных оттенков. На базальной и выпуклой поверхности правой височной доли, в проекции описанной эпидуральной гематомы определяется участок утолщения рельефа головного мозга, размерами 6х5 см. Вещество мозга в зоне утолщения также имеет розовато-синевишный оттенок. Головной мозг дробный на ощупь, при исследовании форму сохраняет с трудом, массой 1340 г. Митак мозговые оболочки вдоль продольной щели головного мозга незначительно утолщены, белесовато-серого цвета зернистого характера. В остальных отделах митак мозговые оболочки тонкие, полупрозрачные. Сосуды оболочек не расширены. Полушария головного мозга симметричны, почасные извилины в межполушарную щель не выступают. Борозды и извилины головного мозга аттенены. Ширина прямых извилин измеримых на одном уровне по 0,8 см, паритетальных по 2 см. Миндалины мозжечка резко подчеркнуты. В веществе ствола обнаружены микрочастицы мелкоочаговые темно-синевишно-красные кровоизлияния. Вещество мозга на разрезе влажное, блестящее, липнет к ножу, с выраженным синевишным оттенком. На поверхности разрезов головного мозга выступает жидкая кровь, в виде небольшого количества точек и полосок красного цвета, легко стираемых бушным ножом. Границы между белым и серым веществом выражены хорошо. Подкорковые ядра расположены симметрично. Желудочки мозга не расширены. В желудочках мозга содержится небольшое количество желтоватой прозрачной жидкости. Выстилка желудочков гладкая, блестящая, с нерасширенными кровеносными сосудами. Сосудистые сплетения серо-розового цвета. Мозжечок на разрезе имеет древовидное строение. Артерии головного мозга содержат следы жидкой крови. Стенки артерий несколько утолщены, с небольшим количеством желтоватых плотных ослизненных бляшек. Гипофиз плоскоэллипсоидной на ощупь, размерами 1,1х0,5х0,3 см, неправильной бобовидной формы, с поверхности серо-розового цвета. Гипофиз на разрезе с разлитой границей между долями, без видимых кровоизлияний. В митакх тавиных шн и правой подлопаточной области слонистые, темно-красные, несколько тусклые кровоизлияния. Кровоизлияний в других отделах митак тавиных шн, груди, живота нет. Мышцы шн, груди и живота красно-коричневого цвета умеренно влажные. Толщина подкожной жировой клетчатки на