

- б) Непротивоположные разрывы разрывов мышечных тканей передней поверхности шеи в средней трети.
- в) Ссадины на подбородке по срединной линии.
- г) Н-тип 9-каверн - 9-тетрагидроксианализиол в крови и моче.

На основании вышеизложенного прихожу к следующему заключению:

1. Смерть наступила от механической асфиксии, развившейся в результате сдавления органов шеи петлей при повешении, о чем свидетельствуют признаки, указанные в п. А.
2. Судя по выраженности ранних трупных явлений при исследовании трупа можно сделать вывод, что смерть наступила более чем за 24 - 36 часов до исследования трупа.
3. Наличие на трупе циркулярно расположенных трупных пятен может свидетельствовать о том, что смерть наступила более чем за 12 часов до обнаружения трупа.
4. Ранние ранения, указанные в п. Б, были причинены предметом с острым режущим краем незадолго до смерти, в причинно-следственной связи с ее наступлением не состоят; у живых лиц обычно причиняют легкий вред здоровью, т.к. влекут за собой кратковременное расстройство здоровья на срок не более 21-го дня (п. 8.1. медицинских критериев определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека, утвержденных приказом Минздрава СССР от 24.04.08 г.).

3. Ссадины, указанные в п. В, причинены твердыми тупыми предметами незадолго до смерти, в причинно-следственной связи с ее наступлением не состоят, у живых лиц вреда здоровью не причиняют, т.к. не влекут за собой кратковременное расстройство здоровья (п. 9. медицинских критериев определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека, утвержденных приказом Минздрава СССР от 24.04.08 г.).

6. Установить конкретные орудия причинения повреждений, указанных в п. Б, В, по имеющимся судебно-медицинским данным не представляется возможным, т.к. в повреждениях не отобразились конструктивные особенности травмирующей поверхности