

SL a PA pracovisko ÚDZS

██████████/08-SL

Meno: [REDACTED] rod.: [REDACTED]
nar. [REDACTED] 1962 r.č.: [REDACTED] 6639 Zdr.poisťovňa: [REDACTED]
Stav: neuvedený Zamestnanie: neuvedené
bytom: [REDACTED] okr. Trebišov

Deň smrti:	28.06.2008	hod.:	████████	Pitvali:	MUDr. ██████████
Deň pitvy:	30.06.2008	hod.:	████████		MUDr. ██████████
Čas od momentu smrti do pitvy:	cca 44 hod.		Druh pitvy:		súdnolekárska
Kategória a druh smrti:		násilná - samovražda obesením			Č.j.: -
Pitvu nariadil:	prehliadajúci lekár			uznesením č.:	-
Pitevný sanitár:	██████ ████████			Dokumentácia pitvy:	██████████

Išlo o 46-ročného muža, ktorý bol dňa 28.06.2008 v poobednajších hodinách nájdený príbuznými obesený na povale rodinného domu v [REDAKOVANÉ], po zvesení a pokusoch o oživovanie nejavil známky života. V čase o 15:25 hod. bola privolaná RZS, ktorá prišla na miesto o 15:32 hod., lekár RZS MUDr. [REDAKOVANÉ] okamžite započal OTI, UPV a KPCR, ktorá bola neúspešná, smrť konštatovaná o 16:04 hod. Menovaný bol psychiatrickým pacientom, ambulantne sa liečil na schizofréniu (posledný lekársky záznam zo dňa 02.06.2008). Prehliadka mŕtveho bola vykonaná toho istého dňa, prehliadajúci lekár MUDr. [REDAKOVANÉ] uviedol, že ide o smrť obesením. Sprievodný list o prehliadke mŕtveho k pitve nebol nie je vystavený. Bola nariadená "zdravotno-bezpečnostná pitva". Škrtidlo bolo dodané k pitve zvlášť.

Prehliadajúci lekár: MUDr. [REDACTED] (ambulancia Trebišov)

Diagnóza prehliadajúceho lekára:

BPS - Smrť obešením (X 70)

ZPZ - neuvedené

Ko - neuvedené

VN - Schizofrénia (F 20.0)

Išlo o: samovražda

Miesto smrti: doma

Ošetrujúci lekár: MUDr. [REDACTED] Trebišov)

- resuscitácia dňa 28.06.2008 od 15:32 hod. do 16:04 hod.

Terapia: na mieste - OTI, UPV, KPCR, defibrilácia 1x200J, Adrenalin 3 mg e.t. a 1 mg i.v., Atropín 3 mg e.t. a 1 mg i.v.

[illegible]

1. VONKAJŠIA OBHLIADKA

Vonkajšia obhliadka mŕtveho tela sa uskutočnila dňa 30.06.2008 v pitevni

Obhliadka šatstva. Počas vonkajšej obhliadky zomrely mal na sebe nasledujúce kusy šatstva a obuvi:

- nohavice montérkové modrej farby, mechanicky nepoškodené, pod nimi sú slipy tmavozelenej farby,
- košeľa s krátkymi rukávmi, vzorovaná, žltó-hnedo-modrej farby, mechanicky nepoškodená, vpredu rozopnutá,
- tielko bielej farby, rozstrihnuté vpredu (stav po poskytnutí resuscitačnej starostlivosti),
- na nohách zomrelého sú ponožky sivej farby a koženkové topánky čiernej farby.

Ide o telo zomrelého 46-ročného muža výšky 173 cm, hmotnosti 74 kg, kostry a výživy primeranej, svalstva symetrického a primerane vyvinutého.

Koža voskovobelavej farby, posmrtné bledá, na horných a dolných končatinách obojstranne je vyznačený fenomén "husej kože".

Mŕtvolná stuhnutosť čiastočne uvoľnená.

Mätvolné škvrrny modrofialovej farby, splývajúce na zadných plochách trupu, končatin a na krku, ťažko vytlačiteľné.

Hlava, vlasatá časť súmerná, krytá hustejšími vlasmi čiernej farby, jej koža bez známkor poranenia.

Tvár súmerná, bez stôp násilia.

Oči súmerné, v strednom postavení, bez stôp násilia.

Spojovky výrazne pasívne prekrvené.

Rohovky ľahko skalené. **Zreničky** súmerné, nerozšírené.

Vonkajšie zvukovody bez výtoku, ušnice bez známkor poranenia.

Nos bez výtoku.

Ústa neporušené, bez výtoku, sliznica dutiny ústnej bez stôp mechanického násilia.

Chrup ošetrovaný, nekompletný: v hornom zuboradí chýbajú 2 zuby (č. 26, 27), v dolnom zuboradí chýba 5 zubov (č. 35, 36, 37, 46, 47), všetky s vyhojenými lôžkami, zuby č. 18 a 28 (stoličky) horného zuboradia neprerezané, zub č. 48 chorobne poškodený kariesom. Schéma chrupu (X = zub neprítomný - lôžko vyhojené, C = karies s chorobným poškodením korunky, N = zub neprerezaný):

	8	7	6	5	4	3	2	1		1	2	3	4	5	6	7	8	
P	N														N	X	X	L
P	C	X	X											X	X	X		L
	8	7	6	5	4	3	2	1		1	2	3	4	5	6	7	8	

Krk primeraný, v hornej časti je prítomná typická uzavretá ryha po škrtidle (popis dodaného zvlášť škrtidla pozri v ods. 4 "Dôkazové predmety dodané k pitve") charakteru vtlačenej pruhovitej kožnej odreniny šírky 1,5 - 2,6 cm, hĺbky do 0,2 cm, s členitou, šikmo pruhovanou reliéfnou suchou spodinou ružovočervenej a bledoružovej farby, pokožka spodiny ryhy je stenčená, komprimovaná, uvedená ryha je orientovaná obojstranne šikmo dozadu, mierne zdola nahor, odtlačkovitá stopa po uzle škrtiacej slučky sa nachádza v záhlavnej oblasti vpravo, asi 4,5 cm za pravou ušnicou. Reliéf spodiny ryhy zodpovedá je plastickým odtlačkom reliéfu dodaného zvlášť škrtidla.

Hrudník súmerný, primeraný, v mostíkovej a ľavej bočnej oblasti sú prítomné stopy po elektrodách defibrilátora oválneho tvaru, rozmerov 6,5 x 8 cm.

Prsníky mužského typu, ochlpené, bez stôp násilia.

Brucho pod úrovňou hrudníka, bez čerstvých stôp mechanického násilia, v pravej slabínovej oblasti podbrúšia je stará operačná jazva šikmého priebehu, dĺžky 7 cm.

Vonkajšie pohlavné ústroje mužského typu, veku primerané, bez výtoku, hrádza neporušená.

Anus neznečistený, okraje a koža v okolí bez stôp násilia,

Horné končatiny súmerné, primerané, v ľavej lakťovej jame je prítomná čerstvá stopa po injekčnom vpichu.

Dolné končatiny súmerné, primerané, bez stôp násilia.

Chrbát súmerný, bez stôp násilia.

2. VNÚTORNÁ OBHLIADKA

2.1. Lebečná dutina

Mäkké pokrývky lebečné primerane prekrvené, bez úrazových a ložiskových zmien.

Lebečná klenba rozmerov 16,8 x 13 x 15,5 cm, hrúbka 0,4 - 1,0 cm, kosti a spojenia klenby neporušené.

Tvrdá plena jemná, hladká, voľná, striebrostobelavej farby, neporušená, splavy obsahujú tekutú krv, pod a nad tvrdou plenou bez cudzieho obsahu.

Mozog hmotnosti 1540 g, mozgové pologule symetrické, mozgové závitý, ryhy a brázdy medzi nimi vyhladené, mäkké pleny hladké, ľahko skalené, medzi mäkkými plenami bez patologického obsahu, cievy na spodine mozgu anatomicky správnej konfigurácie, neporušené, ich intima s ojedinelými plošnými plátmí žltobelavej farby, predĺžená miecha, most, mozoček anatomicky správnej štruktúry, na povrchu a na rezoch bez úrazových a ložiskových zmien, tkanivo z rezov "kypí", mozgové tkanivo pologúl na povrchu a na rezoch výraznejšie pasívne prekrvené, lepí sa na nôž, konzistencia mätkoelastická, sivá a biela hmota sa dobre odlišujú, bez ložiskových zmien, hrúbka mozgovej kôry priemerne 0,3 cm, spodinové uzliny a sivorové teleso anatomickej konfigurácie, bez nápadnejších zmien, bočné komory primeranej veľkosti, bez cudzieho obsahu, cievkovkavá spleť bežného vzhľadu, výstelka komôr jemná, lesklá, hladká, hypofýza a epifýza bez ložiskových zmien.

Spodina lebečná neporušená, bez chorobných zmien, atlantookcipitálne spojenie ložiskovo prekrvácavé a rozostúpené v zadnej časti, stredoušné dutiny bez chorobného obsahu.

Tvárové kosti neporušené.

Krčná chrbtica neporušená, bez chorobných zmien.

2.2. Hrudníková dutina

Podkožné tukové tkanivo prednej steny hrudníka hrúbky do 1 cm.

Svalstvo krku a hrudníka hnedočervenej farby, v mostíkovej oblasti, v oblasti hrtana a štítnej žľazy čerstvo ložiskovo prekrvácané.

Stav bránice: vpravo - 5. rebro, vľavo - 5. medzirebrie, neporušená.

Mostík súmerný, priečne zlomený v úrovni 4. rebra.

Poloha orgánov anatomicky správna.

Pohrudnicové dutiny obojstranne bez chorobného obsahu, voľné, medziplúcne bez ložiskových zmien.

Osrdcovníková dutina bez chorobného obsahu, voľná, osrdcovníkový vak neporušený.

Prúca hmotnosti pravé - 850 g, ľavé - 606 g. **Pravé pľúca** celkove nerovnomernej vzdušnosti, v hornom laloku výrazne rozduté, pri zadných okrajoch hypostatické, popľúcnica jemná, lesklá, hladká, v nej sú prítomné roztrúsené krvné výronky priemeru do 0,2 cm, sivočierna kresba popľúcnice stredne výrazná, povrch pľúc hladký, fialovočervenej farby, konzistencia vankúšovitá, miestami elastická, na tlak sa vzdúvajú, tkanivo na rezoch farby ako na povrchu, rezná plocha vlhká, z rezu na tlak vyteká spenená, krvou sfarbená tekutina v primeranom množstve, priedušky mierne rozšírené, ich sliznica ružovej farby, ložiskovo povlečená krvou sfarbeným hlienom, vetvy pľúcnice anatomického priebehu, voľné, výstelka bez ložiskových zmien. **Ľavé pľúca** zhodné ako pravé.

Srdce rozmerov 12 x 9,5 x 6,5 cm, hmotnosti 312 g. Osrdie jemné, lesklé, hladké, bez ložiskových zmien, tukové tkanivo pod osrdím primerané, hranica tukového tkaniva so svalovinou ostrá, dutiny srdca vpravo sú mierne rozšírené, obsahujú tekutú krv, ušká oboch predsiení voľné, oválny otvor uzavretý, svalovina pravej komory hrúbky do 0,3 cm, ľavej komory hrúbky do 1,9 cm, konzistencia elastická, hnedočervenej farby, trámce nezhrubnuté, na rezoch s drobnými čiarkovitými prúžkami sivobelavej farby, bradavkovité svaly a chlopňový systém anatomickej konfigurácie, bez patologického nálezu, vnútro srdie jemné, lesklé, hladké, bez ložiskových zmien. Vencovité tepny odstupujú a prebiehajú anatomicky správne, prítomné kôrnatenie ľahkého stupňa, ich vnútorná výstelka prestúpená ojedinelými plošnými aterosklerotickými pláťmi. Pľúcnicca primeraná, výstelka jemná, lesklá, hladká, bez ložiskových zmien. Srdcovnica: vystupujúca časť primeraná, oblúk srdcovnice a hrudníková srdcovnica anatomického priebehu, s typicky odstupujúcimi vetvami, jej výstelka prestúpená ojedinelými aterosklerotickými pláťmi žltobelavej farby priemeru do 0,5 cm.

Jazyk nepovlečený, nepohryzený, na rezoch bez ložiskových zmien.

Mandle nezväčšené, bez ložiskových zmien.

Hltan a pažerák: stena neporušená, bez defektov, sliznica pozdĺžne zriadená, sivoružovej farby, nepovlečená, bez ložiskových zmien.

Jazyčka a chrupky hrtana vizuálne skontrolované, neporušené, mäkké tkaniva v okolí sú ložiskovo prekrvácané.

Hrtan a priedušnica: stena neporušená, bez defektov, sliznica jemná, lesklá, hladká, ružovej farby, povlečená krvou sfarbeným hlienom.

Štítna žľaza nezväčšená, súmerná, konzistencia elastická, puzdro ložiskovo prekrvácané, parenchým na reze bez ložiskových zmien, hnedočervenej farby.

Detická žľaza involovaná, stukovatená, okolité tkanivo bez ložiskových zmien.

Lymfatické uzliny hrudníkovej dutiny nezväčšené, ružovofialovej farby, na rezoch bez ložiskových zmien.

Rebrá neporušené, odolnosť voči skúšobnému nalomeniu je normálna.

Hrudníková chrbtica v úrovni C2-C7 neporušená, bez deformít, bez chorobných zmien.

2.3. Brušná dutina

Podkožné tukové tkanivo prednej brušnej steny: hrúbka v nadbruší a v podbruší do 1,5 cm.

Poloha orgánov anatomicky správna, veľká predstierka bez úrazových a ložiskových zmien.

Pobrušnica a brušná dutina: nástenná a útrobná pobrušnica jemná, lesklá, hladká, nepovlečená, bez zrastov, pobrušnicová dutina a zapobrušnicový priestor bez cudzieho obsahu.

Slezina rozmerov 13 x 7,5 x 6 cm, hmotnosti 250 g, udržiava svoj tvar, puzdro jemnozrnné, zriadené, sivofialovej farby, konzistencia elastická, tkanivo na povrchu aj na reze fialovočervenej farby, nožom sa z reznej plochy stiera tekutá krv, trámčina znateľná, pulpa nezmnožená.

Nadobličky primerané, kôra okrovožltej farby, dreň sivohnedej farby, bez ložiskových zmien.

Obličky: pravá a ľavá rozmerov 11 x 6,5 x 5 cm, hmotnosti 158 g. **Pravá oblička** primerane veľká, tukové puzdro hrúbky do 0,8 cm, bez ložiskových zmien, väzivové puzdro ľahko zlúpnuteľné, povrch hladký, fialovočervenej farby, cievy v oblasti

bránky bez patologického nálezu, na reze hrúbka funkčného tkaniva primeraná, hranica medzi kôrou a dreňou neostrá, kôra primerane široká, fialovočervenej farby, dreň zvisle žíhaná, tmavofialovočervenej farby, dutý systém nerozšírený, sliznica jemná, lesklá, hladká, bledoružovej farby, bez nápadnejších zmien, močovod primeraný, priechodný. **Ľavá oblička** - nález ako vpravo.

Močový mechúr primerane veľký, cca 150 ml neskaleného nažltlého moču, sliznica jemná, lesklá, hladká, sivoružovej farby, zriadená, bez ložiskových zmien, ústie močovodov primerané.

Predstojnica nezáväčšená, konzistencia elastická, homogénna, na povrchu aj na rezoch ružovobelavej farby, bez ložiskových zmien. **Semenné mechúriky** anatomickej konfigurácie, bez patologického obsahu.

Semenníky sa nachádzajú v miešku, konzistencia elastická, bez chorobného nálezu.

Konečník obsahuje primerané množstvo kašovitej stolice hnedozelenej farby, sliznica jemná, zriadená, sivoružovej farby, bez ložiskových zmien.

Žalúdok primerane veľký, anatomickej konfigurácie, obsahuje cca 250 g kašovitej natráveniny žltobelavej farby, so zvyškami varenej kukurice a vajícok, sliznica jemná, hladká, výrazne pasívne prekrvená, posmrtné autolyzovaná, sivoružovej farby, bez defektov. **Dvanástnik** anatomicky správnej konfigurácie, obsahuje cca 50 g kašovitej natráveniny žltobelavej farby, sliznica jemnozrnitá, sivoružovej farby, bez ložiskových zmien.

Žľazové cesty anatomickej konfigurácie, priechodné, nerozšírené, **žľzník** primeraný, obsahuje cca 3 ml tekutej žľaze hnedožltej farby, stena žľzníka jemná, bez defektov, sliznica sieťovanej štruktúry, bez ložiskových zmien.

Podžalúdková žľaza primerane veľká, konzistencia elastická, štruktúra hrubozrnitá, hnedoružovej farby, bez ložiskových zmien.

Pečeň rozmerov 28 x 14 x 9 cm, hmotnosti 1760 g, primeranej veľkosti, predný okraj ostrý, povrch hladký, puzdro jemné, konzistencia tkaniva elastická, na povrchu aj na rezoch tkanivo hnedočervenej farby, parenchým mierne pasívne prekrvený, štruktúra lalôčikov zachovaná, vrátnicová žila nerozšírená, obsahuje tekutú krv, vnútropečeňové žľazovody primerané, bez chorobného obsahu.

Okružové tenké črevo (lačník a bedrovník) nerozšírené, obsahuje primerané množstvo kašovitej natráveniny hnedozelenej farby, sliznica jemnozrnitá, zriadená, sivoružovej farby, okružie a jeho úpon bez úrazových a ložiskových zmien.

Hrubé črevo s kašovitým obsahom hnedozelenej farby, sliznica jemnozrnitá, sivoružovej farby, bez ložiskových zmien, červovitý prívěsok je prítomný paracekálne, dĺžky 8 cm, bez nápadnejších zmien, v okolí bez zrástov.

Brušná srdcovníca anatomického priebehu, obsahuje tekutú krv, výstelka prestúpená len ojedinelými plošnými pláťmi žltobelavej farby, priemeru do 0,5 cm.

Lymfatické uzliny brušnej dutiny nezáväčšené, ružovofialovej farby, bez ložiskových zmien.

Drieková chrbtica: neporušená, bez deformít, bez chorobných zmien.

Panva: kosti a spojenia panvy neporušené.

2.4. Ostatné časti tela

Dolné končatiny: stehnové žily obojstranne voľné.

3. ÚKONY POČAS PITVY

3.1. Fotografovanie dôkazových predmetov a nálezov pri vonkajšej a vnútornej obhliadke.

3.2. Odber biologického materiálu:

- na toxikologické stanovenie koncentrácie etylalkoholu dvomi na sebe nezávislými laboratórnymi metódami (krv - 10 ml, moč - 10 ml),
- na toxikologické vyšetrenie omamných, návykových látok a bežne užívaných liekov zo skupiny bolestí utišujúcich, upokojujúcich a uspávajúcich - benzodiazepínov, analgetík, antidepresív, barbiturátov, alkaloidov (krv - 20 ml, moč - 20 ml),

3.3. Odber výkrojkov z orgánov a tkanív na mikroskopické histopatologické vyšetrenie.

Doplňujúce odborné vyšetrenia a úkony ordinované pitvajúcim lekárom:

- mikroskopické histopatologické... ÁNO
- vyšetrenie etylalkoholu..... ÁNO
- chemicko-toxikologické..... ÁNO
- biochemické..... nie
- sérohematologické..... nie
- mikrobiologické..... nie
- fotografická dokumentácia..... ÁNO
- videodokumentácia..... nie
- iné odborné vyšetrenia..... nie
- makropreparát..... nie

4. DŮKAZOVÉ PREDMETY DODANÉ K PITVE

K pitve je zvlášť dodané škrtidlo: pletené trojzväzkové ťažné lano, sivohnedej farby, celkovej dĺžky 160 cm, priemeru 1,1 cm, na koncoch zauzlené.

Skončené.

XX

5. DOPLŇUJÚCE ODBORNÉ VYŠETRENIA

5.1. Mikroskopické histopatologické vyšetrenie (PP č. 08-SL) -

7 bločkov, 8 preparátov:

1,2. Pľúca: [1-pravé pľúca]: Akútna venostáza, takmer difúzne akútne alveolárne a bronchiolárne rozdutie. Ložiskové nahromadenie antrakofágov v terminálnych bronchiolách a alveolách. [2-ľavé pľúca]: Ako pravé pľúca, navyše je prítomný alveolárny edém a ložiská čerstvých alveoláríí.

3. Srdce, ľavá komora: Nedokrvenie myokardu. Ložisková leukostáza. miestami s výstupom leukocytov do interstícia. Celkom mierny intersticiálny edém. Ložiskové stenčenie a zvlnenie snopcov svalových vlákien. Ľahká ložisková intersticiálna fibróza.

4. Pečeň, pravý lalok: Výrazná akútna venostáza. Zvýšená regeneračná aktivita hepatocytov. Mierna chronická nešpecificky reaktívna hepatitída. [Preparát č. 4S – farbenie na tuky]: prakticky negatívne.

5. Oblička pravá: Výrazná akútna venostáza. Bez podstatnejších histopatologických zmien.

6. Mozog, ľavý čelový lalok: Edém stredného stupňa prevažne pericelulárne.

7. Koža krku pri škrtidle: Čiastočne až úplne odlúpnutá rohová vrstva, oploštená epiderma. V derme je prítomná leukocytárna reakcia charakteru perikapilárnej celulizácie až infiltrácie papilárnej vrstvy kória (vitálna reakcia).

XX

5.2. Toxikologické a biochemické vyšetrenie: (č. 2008)

	Krv	Moč
Benzodiazepíny.....	R	negat.
Analgetiká.....	R	negat.
Antidepresíva.....	R	negat.
Barbituráty.....	R	negat.
Alkaloidy.....	R	negat.

Koncentrácia etylalkoholu v biologickom materiáli, g/kg:

(PCh-č. /2008, W-č. /2008)

Krv, PCh.....0,00

Krv, W.....0,10

Moč, PCh.....0,10

Moč, W.....0,33

5.3. Mikrobiologické vyšetrenie: nerobené

5.4. Sérologické vyšetrenie: nerobené

5.5. Iné vyšetrenia: nerobené

5.6. Mafo: 11 digfoto (v)

Mifo:

5.7. Makropreparát: nerobný

5.8. Dokumentácia a poznámky k prípadu:

5.8.1. Nebolo žiadne dožiadanie z PZ. Záznam psychiatra je založený v PP.

XX

RITEVNÝ NÁLEZ (PP č. 08-SL)

Bezprostredná príčina smrti:

Udusenie obesením.

Základné porušenie zdravia:

Schizofrénia (v ambulantnej liečbe – klinický údaj).

Obesenie.

Komplikácie a súvisiace nálezy:

Typická uzavretá ryha po škrtidle v hornej časti krku (škrtidlo dodané k pitve zvlášť).

Rozostúpenie a ložiskové prekrvácane atlantookcipitálneho spojenia v zadnej časti.

čerstvé ložiskové prekrvácanie svaloviny krku a hrudníka v mostíkovej oblasti, v oblasti hrtanu a štítnej žľazy.
čerstvé ložiskové prekrvácanie puzdra štítnej žľazy.
Mierna dilatácia pravej predsene a pravej komory srdca.
Univerzálna akútna venostáza.
Akútne alveolárne a bronchiolárne rozdutie obidvoch pľúc.
Alveolárny edém ľavých pľúc.
Roztrúsené krvné výronky v popľúcnici obojstranne.
Edém mozgu stredného stupňa.
čerstvá stopa po injekčnom vpichu v ľavej lakťovej jame.
Stopy po elektródach defibrilátora v mostíkovej a ľavej bočnej oblasti hrudníka.

Pridružené ochorenia:

-

Vedľajší nález:

Čelková ateroskleróza ľahkého stupňa.
Ložisková intersticiálna fibróza myokardu komôr srdca ľahkého stupňa.
Alveolárna antrakóza obidvoch pľúc.
Stará operačná jazva v pravej slabínovej oblasti podbrušia.

Kódy MKCh-10 -- BPS: [T 71] **ZPZ:** [F 20],[T 71] **VP:** [X 70]

Pitevná epikríza:

Išlo o 46-ročného muža, ktorý bol dňa 28.06.2008 v poobedňajších hodinách nájdený príbuznými obesený na povale rodinného domu v [REDACTED], po zvesení a pokusoch o oživovanie nejavil známky života. V čase o 15:25 hod. bola privolaná RZS, ktorá prišla na miesto o 15:32 hod., lekár RZS MUDr. [REDACTED] okamžite započal OTI, UPV a KPCR, ktorá bola neúspešná, smrť konštatovaná o 16:04 hod. Menovaný bol psychiatrickým pacientom, ambulantne sa liečil na schizofréniu (posledný lekársky záznam zo dňa 02.06.2008). Prehliadka mŕtveho bola vykonaná toho istého dňa, prehliadajúci lekár MUDr. [REDACTED] (Trebíšov) uviedol, že ide o smrť obesením. Sprievodný list o prehliadke mŕtveho k pitve nebol nie je vystavený. Bola nariadená "zdravotno-bezpečnostná pitva". Vykonanou súdnolekárskou pitvou a doplňujúcimi odbornými vyšetreniami bola zistená bezprostredná príčina smrti - udusenie obesením. Škrtidlo bolo dodané k pitve zvlášť.

Pitvajúci lekár:

MUDr. [REDACTED]